

SaniPeg®

MACROGOL Polvere per
soluzione orale

COMPOSIZIONE

Macrogol, sucralosio.

CONFEZIONI

SANIPEG® è disponibile nelle seguenti confezioni:

- 20 bustine monodose da 4 grammi;
- 20 bustine monodose da 10 grammi;
- barattolo da 300 grammi con misurino.

COME AGISCE: il Macrogol è un polimero inerte idrosolubile ad alto peso molecolare che ha la capacità di legarsi all'acqua utilizzata per l'assunzione trattenendola nelle feci. Determina una reidratazione ed un ammorbidimento della massa fecale e ne facilita l'evacuazione. Accelera il transito intestinale favorendo la peristalsi. Non viene assorbito o metabolizzato nel tratto gastro-intestinale e non porta a squilibri idro-elettrolitici, se assunto con la dose indicata di liquido.

INDICAZIONI: trattamento sintomatico della stipsi. Favorisce la peristalsi, aiutando ad avere un'adeguata evacuazione intestinale, contrastando così la stitichezza e prevenendo la formazione di fecalomi.

AGISCE ENTRO 24-72 ORE

AVVERTENZE: Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La somministrazione nei bambini deve essere effettuata sotto diretto controllo di un adulto. Si consiglia di utilizzare il prodotto in età pediatrica dopo aver consultato il medico. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata. Consultare il medico prima dell'uso in gravidanza e allattamento. Il prodotto può ridurre il tempo di permanenza nell'intestino e quindi l'assorbimento di medicinali ad uso orale. Si consiglia pertanto di consultare il medico in caso di assunzione contemporanea di medicinali ad uso orale, che devono in ogni caso essere somministrati ad una distanza di almeno due ore. Il prodotto può comportare un potenziale effetto di interazione quando utilizzato con addensanti alimentari a base di amido. Il macrogol contrasta l'effetto addensante dell'amido, liquefacendo i preparati che dovrebbero invece restare densi per consentire l'assunzione da parte di persone con problemi di deglutizione. In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico.

CONTROINDICAZIONI

Non assumere SANIPEG® in caso di:

- Ipersensibilità nota verso uno o più componenti
- Perforazione, ostruzione o stenosi intestinale
- Ileo paralitico
- Gravi malattie infiammatorie dell'intestino (es. colite ulcerosa, malattia di Crohn, megacolon tossico)

L'uso dei lassativi è controindicato nel caso in cui siano presenti dolori addominali acuti o di origine sconosciuta, nausea e vomito, sanguinamento rettale di origine sconosciuta e in caso di grave stato di disidratazione.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE E POSOLOGIA:

SANIPEG® 10 g

Indicato per adulti e bambini di età superiore ai 12 anni. Da 1 a 4 bustine al giorno.

La dose deve essere aumentata o diminuita, a seconda della risposta individuale al trattamento, in modo da consentire una evacuazione regolare di feci morbide. La dose massima necessaria non supera normalmente le 4 bustine al giorno.

Sciogliere la polvere in acqua o altro liquido (125 ml per ogni bustina) ed assumere immediatamente. Si consiglia di somministrare il prodotto al mattino nel caso si debba assumere la dose minima (1 bustina al giorno). Per dosi maggiori suddividere l'assunzione tra mattino e sera.

Qualora non si dovesse notare alcun miglioramento dopo 7 giorni di trattamento, consultare il medico.

SANIPEG® 4 g

Indicato per bambini di età compresa tra 6 mesi e 12 anni.

Da 6-10 Kg: 1 bustina al giorno

Da 10-15 Kg: 1-2 bustine al giorno

Da 16-20 Kg: 2-3 bustine al giorno

Da 21-43 Kg: 3-4 bustine al giorno

La dose deve essere aumentata o diminuita, a seconda della risposta individuale al trattamento, in modo da consentire una evacuazione regolare di feci morbide. La dose massima necessaria non supera normalmente le 4 bustine al giorno.

Sciogliere la polvere in acqua o altro liquido (50 ml per ogni bustina) ed assumere immediatamente. Si consiglia di somministrare il prodotto al mattino nel caso si debba assumere la dose minima (1 bustina al giorno). Per dosi maggiori suddividere l'assunzione tra mattino e sera.

Qualora non si dovesse notare alcun miglioramento dopo 7 giorni di trattamento, si consiglia di consultare il medico.

EFFETTI INDESIDERATI: potrebbero verificarsi alcuni disturbi gastro-intestinali (mal di pancia, flatulenza, gonfiore addominale, nausea e incontinenza fecale). La diarrea è un effetto secondario all'assunzione di dosi eccessive di SANIPEG® ed è evitabile diminuendo la dose di assunzione. Sono stati riportati raramente casi di reazioni da ipersensibilità (rash cutaneo) a seguito dell'utilizzo di prodotti contenenti macrogol. Nel caso, sospendere il trattamento e consultare il medico.

SENZA GLUTINE, SENZA LATTOSIO, SENZA ZUCCHERI.

Data ultima revisione: Gennaio 2024
(IFU1_01/24r1_12/25)

DISPOSITIVO MEDICO  0373

I PRODOTTI SANITAS SI TROVANO IN FARMACIA



Biofarma
Via Castelliere, 2
Mereto di Tomba (UD)

Distributore:
SANITAS Farmaceutici S.r.l.
Via Emilia 168/A - 15057 Tortona (AL)
www.sanitasfarmaceutici.it

 **SANITAS**
FARMACEUTICI 1931

