

SaniPeg® ESSE

MACROGOL - Simeicone

Soluzione orale pronta da bere



COMPOSIZIONE

Acqua depurata, macrogol, acido poliaccrilico, simeticone, acido citrico, potassio sorbato, sodio benzoato, sucralosio.

CONFEZIONI

Sanipeg Esse è disponibile nelle seguenti confezioni:
- 15 bustine monodose da 20 ml

COME AGISCE

Il macrogol è un polimero inerte idrosolubile ad alto peso molecolare che ha la capacità di legarsi all'acqua utilizzata per l'assunzione trattenendola nelle feci. Determina una reidratazione e un ammorbidimento della massa fecale e ne facilita l'evacuazione. Accelera il transito intestinale favorendo la peristalsi. Non viene assorbito o metabolizzato nel tratto gastrointestinale e non porta a squilibri idro-elettrolitici, se assunto con la dose indicata di liquido. Il prodotto contiene simeticone, una sostanza che ha la capacità di diminuire la tensione superficiale delle bolle di gas presenti nel tratto gastrointestinale, facilitandone l'espulsione. L'eliminazione dei gas riduce la sensazione di gonfiore e distensione addominale.

INDICAZIONI

Trattamento sintomatico della stipsi. Favorisce la peristalsi, aiutando ad avere un'adeguata evacuazione intestinale, contrastando così la stitichezza e prevenendo la formazione di fecalomi.

AGISCE ENTRO 24-72 ORE

AVVERTENZE

La somministrazione nei bambini deve essere effettuata sotto diretto controllo di un adulto. Consultare il medico prima dell'uso in gravidanza e allattamento. Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata. Il prodotto può ridurre il tempo di permanenza nell'intestino e quindi l'assorbimento di medicinali ad uso orale. Si consiglia pertanto di consultare il medico in caso di assunzione contemporanea di medicinali ad uso orale, che devono in ogni caso essere somministrati ad una distanza di almeno 2 ore. Il prodotto può comportare un potenziale effetto di interazione quando utilizzato con addensanti alimentari a base di amido. Il macrogol contrasta l'effetto addensante dell'amido, liquefacendo i preparati che dovrebbero invece restare densi per consentire l'assunzione da parte di persone con problemi di deglutizione. In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico.

CONTROINDICAZIONI

Non assumere **SANIPEG® ESSE** in caso di:

- Ipersensibilità nota verso uno o più componenti
- Ileo paralitico
- Perforazione, ostruzione o stenosi intestinale
- Gravi malattie infiammatorie dell'intestino (es. colite ulcerosa, malattia di Crohn, megacolon tossico)

L'uso dei lassativi è controindicato nel caso in cui siano presenti dolori addominali acuti o di origine sconosciuta, nausea e vomito, sanguinamento rettale di origine sconosciuta e in caso di grave stato di disidratazione.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE E POSOLOGIA

Indicato per adulti e bambini di età superiore ai 12 anni.

- da 1 a 4 bustine al giorno.

La dose deve essere aumentata o diminuita, a seconda della risposta individuale al trattamento, in modo da consentire un'evacuazione regolare di feci morbide. La dose massima necessaria non supera normalmente le 4 bustine al giorno.

La soluzione orale va assunta tal quale. Subito dopo l'assunzione del prodotto è necessario bere circa 125 ml di acqua per ogni bustina utilizzata.

Si consiglia di somministrare il prodotto al mattino nel caso si debba assumere la dose minima (1 bustina al giorno). Per dosi maggiori suddividere l'assunzione tra mattino e sera. Qualora non si dovesse notare alcun miglioramento dopo 7 giorni di trattamento, consultare il medico.

EFFETTI INDESIDERATI

Potrebbero verificarsi alcuni disturbi gastrointestinali (mal di pancia, flatulenza, gonfiore addominale, nausea e incontinenza fecale).

La diarrea è un effetto secondario all'assunzione di dosi eccessive di **SANIPEG® ESSE** ed è evitabile diminuendo la dose di assunzione. Sono stati riportati raramente casi di reazioni da ipersensibilità (rash cutaneo) a seguito dell'utilizzo di prodotti contenenti macrogol.

Nel caso, sospendere il trattamento e consultare il medico.

Data ultima revisione: Gennaio 2025
(IFU1_01/25r0_01/25)

DISPOSITIVO MEDICO  0373

I PRODOTTI SANITAS SI TROVANO IN FARMACIA



Biofarma
Via Castelliere, 2
Mereto di Tomba (UD)

Distributore:

SANITAS Farmaceutici S.r.l.
Via Emilia 168/A - 15057 Tortona (AL)
www.sanitasfarmaceutici.it

 **SANITAS**
FARMACEUTICI 1931